

**Бережіть себе та своїх
близьких!**



**Навчально-методичний центр
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності
Кіровоградської області**

**ХВОРОБА КОТЯЧИХ
ПОДРЯПИН: В ЧОМУ
НЕБЕЗПЕКА?**



м. Кропивницький

Наша адреса:

Україна, 25009, Кіровоградська обл.,
місто Кропивницький, вул.Глинки,
будинок 2
тел. 0522 330 015
e-mail: nmc.kirovohrad@dsns.gov.ua
сайт: www.kr.dsns.gov.ua
ми у Facebook:



Хвороба котячих подряпин або, по-науковому, феліноз, доброякісний лімфоретикульоз, викликається бактеріями *Bartonella*. Це інфекційна хвороба, що виникає після подряпини, укусу чи тісного контакту з кішками і характеризується помірно вираженою загальною інтоксикацією, а також збільшенням лімфатичних вузлів, найближчих до місця впровадження інфекції. Іноді вражається нервова система.

Хворіють переважно діти та особи молодше 20 років, найчастіше восени та взимку. Захворювання зустрічається у вигляді одиничних випадків.

!!Збудник – бактерія *Bartonella* або *Bartonellaclarridgeiae*.

!!Резервуар і джерело інфекції – кішки, у яких збудник хвороби є представником нормальної мікрофлори порожнини рота. *Bartonella* потрапляє в організм кішок через укуси бліх, заражених від інших тварин, і може проникати в клітини їх кровоносних судин.

!!Для зараження цим неприємним інфекційним захворюванням деколи дійсно досить невеликого укусу або однієї котячої подряпини на тілі людини. За статистикою, до 40 відсотків кішок можуть бути носіями цих бактерій в певні моменти свого життя, при цьому, не показуючи ніяких видимих ознак. Хвороба котячих подряпин не передається від людини до людини.

!!В особливий період актуальність інформації про хворобу котячих подряпин збільшується. Велика кількість людей і котів переміщується із зони бойових дій, часто вони перебувають в одному приміщенні, що сприяє зараженню блохами. Під дією стресу коти

можуть бути агресивними і вражати шкіру дітей.

Батьки повинні знати, що найменша подряпина котом може становити загрозу здоров'ю дитини, тому слід уважно стежити за її станом та при появі симптомів звертатися до лікаря!

СИМПТОМИ

Інкубаційний період частіше складає 2-3 тижні. Хвороба починається з підвищення температури до 38-39 °, яка тримається від декількох днів до 2 тижнів. Відзначаються головні і м'язові болі, іноді порушення функції кишечника, висипання на шкірі. У місці котячої подряпини, іноді яка вже майже зажила, виникає сильний запальний процес: опухає тканина, що оточує рану, з'являється червонувата гнійна виразка. Одночасно з'являється найбільш характерний і постійний симптом хвороби – регіонарний лімфаденіт (уражаються ліктьові, пахвові, рідше підщелепні, привушні й інші лімфатичні вузли). Досягнувши своєї максимальної величини, вражений лімфовузол з часом починає зменшуватися. Іноді він також самостійно розкривається в результаті нагноєння. Більш важко хвороба котячих подряпин протікає у людей зі слабкою імунною системою або інфікованих вторинними інфекціями іншого роду. У деяких хворих захворювання ускладнюється менінгітом або іншими ураженнями нервової системи.

ОСНОВНІ ПРОЯВИ ЗАХВОРЮВАННЯ:

✔Котячі подряпини або укуси не заживають в звичайний відрізок часу.

✔Область почервоніння навколо подряпини або укусу продовжує зростати через 2 дні після контакту з кішкою.

✔Лихоманка триває протягом декількох днів після пошкодження шкіри кішкою.

✔Хворобливість і збільшення лімфовузлів протягом більше 2 або 3 тижнів після контакту з твариною.

✔Біль в кістках або суглобах, черевна біль (без лихоманки, блювання або діареї) або незвичайна ступінь втоми через 2 або 3 тижні після укусу кішки.

ЛІКУВАННЯ:

Відсутність спеціальних засобів, що впливають на *Bartonella*, трохи ускладнює процес терапії. Лікування даної хвороби залежить від тяжкості перебігу та локалізації процесу. Курс лікування, як правило, складається з антибактеріальних препаратів і ліків, що зміцнюють імунітет. При нормальному стані імунної системи лікуванням проходить протягом одного або двох місяців. Після перенесеного захворювання розвивається стійкий імунітет до паличок *Bartonella*.

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ:

✔профілактика і лікування блох у кішок: обробка вовни кішки спеціальними засобами для захисту від бліх, огляд на предмет бліх, миття кішки дезінфікуючими шампунями;

✔якщо пошкодження шкірного покриву дитини відбулося, місце подряпини або укусу потрібно негайно промити 2% розчином перекису водню або препаратом «Мірамістин», а потім дезінфікувати йодом або зеленкою;

✔щеплень не існує.