



ПРО ПРАВЕЦЬ

Правець — це захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій *Clostridium tetani*, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Можна інфікуватися правцем при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається.

Симптоми правця:

*стиснення щелеп;
м'язові спазми — часто в шлунку;
болісна напруга у всьому тілі;
проблеми з ковтанням;
«витріщання» очей;
головний біль;
лихоманка та надмірне потовиділення;
зміна артеріального тиску та прискорене серцебиття;
неконтрольоване/мимовільне скорочення мускулатури голосових зв'язок (ларингоспазм);
ламкість кісток;
ускладнення дихання.*

Ускладнення, які може викликати правець:

*закупорка головної або однієї з дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, що потрапив з інших частин тіла через кровообіг (емболія легеневої артерії);
пневмонія, легенева інфекція.*

Правець може призвести до смерті.

Симптоми можуть з'явитися протягом 3–21 дня після зараження. У разі появи перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря. За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті майже стовідсоткова. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі — від 10% до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини та її загального стану здоров'я.

Єдиний спосіб захиститися від правця — вакцинація. Імунітет після захворювання не формується, і є ймовірність повторного зараження, тому вакцинація необхідна, навіть якщо ви хворіли.

Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики правця необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим поновлювати щеплення від правця необхідно кожні 10 років.

Відмовившись від вакцинації, ви ставите під загрозу свої життя і здоров'я.

ФАКТИ ПРАВЕЦЬ

ЯК ПОТРАПЛЯЄ В ОРГАНІЗМ



порізи



опіки



оброблення рани
антисептиками не допомагає
знешкодити спори правця!

ХТО В ЗОНІ РИЗИКУ



новонароджені



діти від 3 до 7 років



хлопчики-підлітки

СИМПТОМИ



загальна слабкість



дратівливість



головний біль



судоми




тягнучий біль у м'язах
ший, потилиці, спини
й попереку



відчуття тривоги та
страху



порушення сну



зупинка дихання

ПРОФІЛАКТИКА

Щеплення

дорослим - кожні 10 років

дітям - 2,4,6,18 міс., 6 і 16 років

ВАЖЛИВО!

СМЕРТНІСТЬ сягає 70%
люди, що хворіли на ПРАВЕЦЬ, РИЗИКУЮТЬ
ЗАХВОРИТИ ПОВТОРНО - ІМУНІТЕТ НЕ ФОРМУЄТЬСЯ!